



CONSILIUL JUDEȚEAN
TIMIȘ



Eradicați

Ambrosia artemisiifolia **(iarba pârloagelor) – o buruiiană** **invazivă care vă îmbolnăvește**



Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor) – o buruiiană
invazivă periculoasă pentru sănătate

Iarba pârloagelor este o buruiană invazivă originară din America de Nord. În ultimii ani s-a răspândit foarte mult în țara noastră și în Europa. Aceasta creează probleme grave de sănătate oamenilor în toate țările unde este prezentă, dar și în cele mai puțin invadate deoarece polenul extrem de alergen parcurge distanțe foarte mari cu ajutorul curenților de aer, ajungând chiar și la mii de kilometri distanță de locul de origine. În zonele invadate de *Ambrosia artemisiifolia*, aceasta devine în cel mai scurt timp principala specie cauzatoare de alergii. Simptomele alergiilor provocate de *Ambrosia artemisiifolia* sunt: rinita alergică, conjunctivita alergică, astm bronșic și mai rar dermatită de contact și reacții anafilactice, acestea putând să dureze chiar câteva luni pe an în perioada de înflorire a plantei.

Unde găsiți *Ambrosia artemisiifolia*?

- Malul apelor curgătoare, incluzând cusuri permanente și temporare;
- Teren arabil, și culturi horticole;
- Grădini și parcuri;
- Zone din apropierea clădirilor din orașe și sate;
- Zone locuite;
- Căi de transport (șosele, căi ferate) și alte suprafețe construite;
- Depozite de deșeuri;
- Materiale de construcție (pietriș);
- Pământ pentru copertări provenit din excavări.

Cum recunoașteți *Ambrosia artemisiifolia*?



... în perioada aprilie-mai...



... în perioada mai-iunie...



... în perioada iunie-august...



...în perioada august-octombrie ...

Cum eradicăm *Ambrosia artemisiifolia*?

- Pe suprafețe mici sau de-a lungul drumului se fac cosiri repetate. La o densitate mică se smulge manual cu mănuși de protecție. Tăierea necorespunzătoare poate duce la ramificarea abundentă și creșterea cantității de polen și semințe produse.

- În terenul arabil se vor efectua lucrări specifice de combatere a buruienilor în culturi (erbicidare – ex: Dicamba, Bromacil) și prelucrarea solului (arat) imediat după recoltare. Terennurile arabile necultivate trebuie cosite cel puțin o dată pe an înainte de înflorirea speciei pentru a evita producerea de polen alergen și de semințe.

- Evitarea transportării din terenuri invadate a solului, pietrișului, mărfurilor, produselor agricole, sau utilajelor care pot fi contaminate cu semințe de iarba pârloagelor.

Material realizat în cadrul proiectului "AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA ÎN JUDEȚUL TIMIȘ – SITUAȚIA DIN TERITORIU ȘI MĂSURI DE ERADICARE DIN TERENUL AGRICOL", parteneri: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara, Camera Agricolă a Județului Timiș și Consiliul Județean Timiș

Autor text și imagini șef lucr. dr. biol. Sărățeanu Veronica – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara.